







FULANITO GARCIA PEREZ

ALERGIAS: no conocidas

Cambios en el tratamiento: AUMENTAR FUROSEMIDA 40 mg a 2 comp por la mañana y 1 comp en comida. INICIAR DELTIUS 25.000 UI, un frasco 1 vez a la semana, y después continuar tratamiento con un frasco al mes.

Medicamento	DESAYUNO	Medio día	Comida	TARDE	Cena	Al acostarse	INDICACIÓN
							
EUTIROX 88 mcg COMP (LEVOTIROXINA) tomar media hora antes del desayuno	1						HIPOTIROIDISMO
FUROSEMIDA 40 mg COMP (SEGURIL) preferentemente con estómago vacío	2		1				PARA ORINAR
OMEPRAZOL 20 mg CAP GASTRORRESIST preferentemente con estómago vacío	1						PROTECTOR GÁSTRICO
BICALUTAMIDA 50 mg COMP			1				NEOPLASIA PRÓSTATA
ACFOL 5 mg COMP (ÁCIDO FÓLICO)			1				ANEMIA / ÁCIDO FÓLICO
ACETILCISTEINA 600 mg COMP EFERVE	1						ELIMINAR MUCOSIDAD
TRAZODONA 100 mg COMP (DEPRAX)					MEDIO		INSOMNIO / AGITACIÓN
ELIGARD SEMESTRAL 45 mg JER (LEUPRORELINA) SUBCUTÁNEO		C/6 meses					NEOPLASIA PRÓSTATA
AMOXICILINA/CLAVULANICO 500/125 mg. Continuar hasta acabar tratamiento	1		1		1		INFECCIÓN RESPIRATORIA
DELTIVUS 25.000 UI SOL ORAL (VIT-D) tomar junto con una comida principal			SEMANAL				VITAMINA-D / HUESOS
METAMIZOL 575 mg CAP (NOLOTIL)					1, SI PRECISA		FIEBRE / DOLOR
PARACETAMOL 1 g COMP --> SI PRECISA (NO tomar más de 4 comp al día)							FIEBRE / DOLOR

OTROS CONSEJOS

DELTIVUS 25.000 UI SOL ORAL: iniciar tratamiento tomando un frasco a la semana durante 4 semanas, y después continuar el tratamiento con un frasco al mes.